


Berzsenyi Dániel Gimnázium  
Matektábor 2011 – Tata

# A ciklois

A 11. évfolyam előadása

# Bevezető

- Mi az a ciklois?
  - Egy olyan görbe, amelyet egy irányított görbén csúszás nélkül legördülő kör egy meghatározott pontja ír le.




# Felfedezése

- Korábban felmerült a kérdés, hogy I.e. 3000 környékén ismertek-e cikloishoz hasonló görbét, ám erre máig nincsen biztos válasz
- 17. században kezdtek el komolyabban foglalkozni vele
- A cikloist kutatta: Gilles de Roberval, Galilei, Cavalieri, Mersenne, Huygens stb.
- Az évek során kiderült, hogy a ciklois nagyon sok szép tulajdonsággal rendelkezik

# A görbék paraméteres egyenlete - 1

- Origó kp.-ú,  $r$  sugarú kör paraméteres egyenlete:
  - $x = r * \cos(t)$ ,  $y = r * \sin(t)$
  - Ahol  $t$  befutja a számegyenest, de  $0$  és  $2\pi$  között már teljes kört kapunk




# A görbék paraméteres egyenlete - 2

- Parabola


- Nem paraméteres egyenlet:  $y = x^2$

- Paraméteres egyenlet:  
 $x = t$  ebből,  $y = t^2$




# A ciklois felírása

- Egy egység sugarú kör által generált ciklois paraméteres egyenlete:
  - $x = t - \sin(t), y = 1 - \cos(t)$



# A görbe alatti terület

- Egy egység sugarú generáló körhöz tartozó ciklois egy ívenek görbe alatti területe:
  - $3 * \pi$ , tehát  $3 * a$  generáló kör területe




# A ciklois egy ívének a hossza

- Felfedezése:
  - Már 1650-es évek előtt próbáltak keresni egy olyan szakaszt ami ezzel az értékkel egyenlő, ám ez nem sikerült
  - 1650-es években egy Pascal által meghirdetett versenyen, Christopher Wren kiszámolta az értéket ám olyan eszközöket használt amiket mi még nem ismerünk
  - Wren számításai alapján, egy  $r$  sugarú körhöz tartozó ciklois egy ívének a hossza:  $8*r$




# Descartes féle érintő szerkesztés




# Descarets féle érintő szerkesztés - 1

- E: E rajta van a körön  
PE  $\parallel$  AC alap
- Q: Q rajta van AC alapon  
PQ  $\parallel$  EC
- PH: P-ben merőleges PQ-ra



# Descartes féle érintő szerkesztés - 2

- Bizonyítás:
  - Tfh. egy hatszög gördül egy egyenesen, és egy pontját származtatjuk



# Descartes féle érintő szerkesztés - 3

- Ha hatszög gördül, egy csúcsa körívek sorozatát írja le, melyek középpontjai rendre az eggyel távolabbi csúcsok (B, C', D', stb.). A körívek érintői merőlegesek az érintési pontot az ív középpontjával, azaz a sokszögnek jelenleg alapon található pontjával összekötő szakaszra. Ugyanez történne egy százmilliárdoldalú sokszöggel, tehát a körrel is.


# Rokon görbék - 1

- Nyújtott ciklois
  - A nyújtott ciklois hasonlóan jön létre mint a sima ciklois, de a pont aminek a nyoma lesz a körön belül található
  - Paraméteres egyenlete:

$$x = a * t - r * \sin(t), y = a - r * \cos(t)$$

*akkor lesz nyújtott ciklois ha  $a < r$*


# Rokon görbék - 2



*a  $P_2$  pont a körön belül van, emiatt  $a_2 < r$ , tehát ha gördítjük a kört a  $P_2$  nyomvonalának a képe egy nyújtott ciklois lesz*

# Rokon görbék - 3

- Egy nyújtott ciklois:



# Rokon görbék – 4


- Hurkolt ciklois
  - A hurkolt ciklois hasonlóan jön létre mint a sima ciklois, de a pont aminek a nyoma lesz a körön kívül található
  - Paraméteres egyenlete

$$x = a * t - r * \sin(t), y = a - r * \cos(t)$$

*akkor lesz hurkolt ciklois ha  $a > r$*




# Rokon görbék - 5



*a P pont a körön kívül van, emiatt  $a > r$ , tehát ha gördítjük a kört a P nyomvonalának a képe egy hurkolt ciklois lesz*

# Rokon görbék – 6

- Egy hurkolt ciklois:



# Hipociklois - 1

- A hipociklois egy síkgörbe, mely úgy származtatható, hogy egy kör kerületén belül csúszásmentesen legördítünk egy másik kört, ennek egy kerületi pontjának nyomvonalát a hipociklois.
- A gördülő kör sugara  $r$ , a nagy kör sugara  $R = k \cdot r$ , ahol  $k$  valós szám.
- Ha  $k$  egész szám a görbe zárt, és  $k$  csúcsa van
- Ha  $k$  racionális,  $k = p/q$ , akkor a görbe  $p$  csúccsal rendelkezik és zárt
- Ha  $k$  irracionális szám, akkor a görbe nem záródik és kitölti a nagy kör és egy  $R - 2 \cdot r$  sugarú kör közötti gyűrű területét

# Hipociklois - 2





- Paraméteres egyenlete:

$$x = (R - r) * \cos(t) + r * \cos\left(\frac{R - r}{r} * t\right)$$

$$y = (R - r) * \sin(t) - r * \sin\left(\frac{R - r}{r} * t\right)$$

$$\text{ahol } \frac{R}{r} = k$$

# Hipociklois - 3



# Epiciklois - 1

- Az epiciklois egy síkgörbe, mely úgy származtatható, hogy egy kör kerületén csúszásmentesen legördítünk egy másik kört, ennek egy kerületi pontjának nyomvonala az epiciklois.
- A gördülő kör sugara  $r$ , a nagy kör sugara  $R = k \cdot r$ , ahol  $k$  valós szám.
- Ha  $k$  egész szám a görbe zárt, és  $k$  csúcsa van
- Ha  $k$  racionális,  $k = p/q$ , akkor a görbe  $p$  csúccsal rendelkezik
- Ha  $k$  irracionális szám, akkor a görbe nem záródik és kitölti a nagy kör és egy  $R+2 \cdot r$  sugarú kör közötti gyűrű területét

# Epicyclois - 2





- Paraméteres egyenlete:

$$x = (R + r) * \cos(t) - r * \cos\left(\frac{R + r}{r} * t\right)$$

$$y = (R + r) * \sin(t) - r * \sin\left(\frac{R + r}{r} * t\right)$$

$$\text{ahol } \frac{R}{r} = k$$


# Epiciklois - 3






# Ciklois a fizikában


# Fogaskerekek



# Brachitochrome probléma



# Csiga labda



- Készítették:
  - Berkes Bence 11.b
  - Bodnár Dávid 11.c
  - Gulyás Lóránt 11.b
  - Kocsis Mátyás 11.b
  - Sztanka-Tóth Tamás 11.c
  - Venczel Tünde 11.c
- Felkészítő tanárok:
  - Baranyai Klára
  - Mahler Attila
- Források:
  - John Martin: The Helen of Geometry  
VOL. 41, NO. 1, JANUARY 2010 THE COLLEGE MATHEMATICS JOURNAL
  - <http://en.wikipedia.org/wiki/Cycloid>
- Eszközök:
  - Geogebra
  - LibreOffice Impress

Köszönjük a figyelmet!